

Nom :

Date de naissance : __/__/____

Adresse :

Tél. :

Prénom :

Sexe : M F

Prélèvement effectué par _____ le __/__/__ à __h__

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- Troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhée ...
- Prurit anal nocturne (démangeaisons)
- Troubles nerveux, troubles du comportement
- Vulvovaginite chez la fillette (le prélèvement peut alors se faire au niveau de la vulve)

INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LE PRELEVEMENT

Le port de gants est obligatoire

- Le prélèvement doit être réalisé le matin au lever avant la toilette et les premières selles : préconisation respectée : oui non
- Matériel nécessaire : scotch **transparent** (2 bandes de 5 cm environ), lames en verre, porte-lame
- Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, appuyer quelques secondes (bien déplier la marge anale)
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame sans faire de bulles d'air
- Recommencer avec le deuxième scotch
- Placer les lames dans le porte-lame, identifier l'étui, placer-le dans un sachet de transport double poche et fermer le sachet
- A rapporter le plus rapidement possible au laboratoire (délai maximum une journée à température ambiante).

Sources : sante.gouv.fr/préanalytique/parasitologie